HKAAC
香港動物領養中心
Hong Kong Animal Adoption Centre

領養動物申請程序

1

第一步

- 首要明白想成為一位負責任的動物主人，你所需要負上的法律責任及經濟承擔。
- 然後了解清楚本中心的領養動物條款及細則。
- 最後才致電本中心熱線號碼 2488 8680，向接線的職員提供你想探訪心儀動物的名稱。

2

第二步

- 停一停，諗一諗之後，你仍然決定領養動物，你便需要透過 5544 5068 本中心申領動物之 Whatsapp 號碼，遞交以下申領文件：
- 詳細陳述家庭狀況及如何照顧狗狗的日常生活。
- 你與領養之動物合照相片一張。
- 全套（共 8 頁申請領養動物文件）。
- 展示你的詳細家居環境影片。
- 申領動物審批時間不一，本中心大概需時 7 至 10 天完成，因此請耐心等候。

3

第三步

- 成功領養人須繳付領養動物相關之醫療支出。
- 同日需一拼遞交申領人之身份證副本及住址證明（必須以最近 3 個月之水/電/煤/家居寬頻/差餉或印有申領人之租約証明）。

4

第四步

- 由確認成功領養當日計，一星期之內領養之動物便可回家，屆時本中心職員便携同所需之食用品交到府上 (車費由領養人自付)，並將領養之狗狗交予新主人開始照顧，整個領養程序及家訪便於此日完成。
- 最後有關狗狗牌照於完成家訪日起計，兩個月之內便可寄出狗牌予領養人。

香港動物領養中心
Hong Kong Animal Adoption Centre

領養狗狗基本醫療費用

1. $1,200 (驗全血 GHP + CBC 上限收費)
   - 肝腎功能紅白血球 十二項指數及離子檢驗 (請參考附件)

2. $300 (4dx 心絲蟲及牛蜱熱病毒檢驗上限收費)
   - 心絲蟲
   - 艾利希體症
   - 片狀邊蟲症
   - 萊姆病

3. $1000 (不論動物本身體重，基本絕育手術，上限收費)
   - 視乎不同診所計算

4. $600 (預防腸病毒針上限收費) (幼犬共 3 支收費/ 成犬共 2 支收費)
   - 視乎不同診所計算

5. $80 (瘋狗症針及動物牌照)

6. $50 (杜蟲)

7. (1-5 項)動物醫療運輸開支 (上限收取$500)

8. 每隻動物膳食及護理開支 (以每天$20 計算上限收取$600 膳食資助)

以上八項醫療開支已平均計算，一律以$4,200 劃一收費
*如領養純種狗隻年齡於5個月大以下，因本中心於此時未能為該狗隻送往絕育手術或領取狗牌，為保障純種狗隻繁衍的原固，成功領養者必須額外繳付 $5000 **按金**，並於指定時間帶該狗隻完成絕育及注射瘋狗針後，便可申請退還。

-雌性動物必須於其五個月大或之前完成絕育及注射瘋狗針
-雄性動物必須於其五個月大或睪丸完全成熟時完成絕育及注射瘋狗針
-有關領養動物之絕育手術，必須由本中心指定之獸醫診所發出証明文件方為有效
-如因動物身體狀況緣故而未能於指定時間完成絕育，必須提前聯絡本中心

*請注意，$4,200 動物基本醫療開支並不包括以下項目：
- 診金
- 藥費
- 洗牙及脫牙
- 小腸氣
- 隱藏性睾丸 (單隱睾或雙隱睾)
- 子宮蓄膿

所有額外醫療開支均有單據及以實報實銷支出收取領養人。

香港動物領養中心
Hong Kong Animal Adoption Centre

申領人個人資料

1) 申請領養者必須年滿二十一歲以上。 (申領者、聯絡人及住址證明必須為同一人。)

2) 不接受申請居住於公共房屋、居屋、劏房、不準狗隻進入之私人住宅、貨倉、商舖。

3) 如需向本中心租借貓狗籠或圍欄，費用為每月$100，期滿由領養者自行歸還至本中心。

申領者身份證(全名) : _____

申領者出生年期 (必須填寫，否則本中心不作考慮): _____

申領人職業: _____

申領人聯絡電話及 WhatsApp 號碼 (必須為同一電話號碼):

_____

申領人住址: _____

申領者簽署 : _____

香港動物領養中心
Hong Kong Animal Adoption Centre

申領狗狗審批咨詢

1.) 你的住宅地址，是否可以合法飼養狗隻? ☐是 ☐否

2.) 你是否清楚明白，需為你所領養的動物支付基本及額外醫療支出?
☐是 ☐否

3.) 飼養動物後，牠們如生病了，你是否預算會增加你平常的生活支出?

☐是 ☐否

4.) 你是否願意接受你所領養的動物未懂得定點上廁所，是需要主人耐心的教導，即使長時間未學懂也會包容牠，絕不棄養?
☐是 ☐否

5.) 你是否願意由本中心於動物回家當日為牠沖涼修剪?
(20 磅內小型犬收費由$248-$488)

☐是 ☐否

6.) 你是否願意經本中心購買一些動物基本預防用品及食品如下，以支持本中心繼續營運?

心絲蟲預防藥 (Heartgard, Nexgard)、殺蝨及牛蜱用品 (Frontline, Bravecto)
☐是 ☐否

乾糧、罐頭、魚油
☐是 ☐否

清潔護理用品: 沖涼液、洗眼水、洗耳水、潔牙水、寵物清潔用品
☐是 ☐否

7.) 會否以捐助形式幫助其他長期病患住在本中心的動物呢？

☐$1500
☐$2000
☐其他 : _____

香港動物領養中心
Hong Kong Animal Adoption Centre

(附件) 心絲蟲的認識

甚麼是心絲蟲？(檢驗 4dx 其一報告)

心絲蟲乃一種由蚊傳播的寄生蛔蟲，犬心絲蟲的感染在香港十分常見，是一種值得關注的狗隻寄生蟲疾病。 成蟲寄生在心血管和肺血管中，可長達 30 釐米。這種疾病可引致狗隻死亡。

心絲蟲的生命週期及傳播

1.) 蚊子叮咬狗隻，幼絲蟲藉此傳入狗隻的體內。

2.) 幼絲蟲進入狗隻的血液循環系統，一般存活於血液末梢。

3.) 當另一蚊子叮咬受感染的狗隻時，會吸入血液中的幼絲蟲。

4.) 幼絲蟲會在蚊子體內發育成具感染力的胚蟲。

5.) 蚊子叮咬另一健康狗隻，並把胚蟲傳入狗兒體內。

6.) 之後胚蟲會發展為成蟲，並遷移到犬隻的心臟及其他主要血管。

7.) 成蟲寄生在心血管和肺血管中，產下幼蟲。

8.) 整個生命週期再次循環。

感染心絲蟲的病症

➢ 初期可能沒有任何明顯症狀，但犬心絲蟲仍會對心肺血管造成損害，腎臟也有可能因身體對犬心絲 蟲的免疫反應而受到影響

➢ 明顯的病徵包括困倦、易疲勞、體重下降、咳嗽、呼吸困難、昏暈和腹脹 (由於上述病徵可能是因 犬心絲蟲以外的其他疾病造成)

➢ 隨著狗兒體內成蟲數量日增，便會干擾心臟正常運作

➢ 最後更會形成充血性心臟衰竭並引致死亡

心絲蟲的預防及治療

治療心絲蟲費用高昂，而且亦相常危險，若犬隻治療期間情緒高漲，有可能會引致死亡。 預 防勝於治療！預防犬心絲蟲的方法比治療來得安全、有效和簡單得多，主要方法有兩種：

1. 預防藥物 — 每月給狗隻服食口服預防藥物 e.g. Heartgard 或進行局部應用(「點滴」)e.g. Advocate

2. 每年到動物診所注射疫苗

*若狗隻 6 個月大或以上仍未曾接受心絲蟲預防，或曾中斷預防療程，有可能須先接受心絲蟲測試。

香港動物領養中心
Hong Kong Animal Adoption Centre

(附件) 牛蜱熱的認識

甚麼是牛蜱熱？(檢驗 4dx 其一報告)

牛蜱熱是巴倍蟲屬原蟲的簡稱，顧名思義就是一種由牛壁蝨（俗稱牛蜱）傳播的疾病，牛蜱熱在香港狗隻的 感染十分常見及危險病。牛蜱熱會破壞動物體內的紅血球造成貧血，如不及時治理，有機會導致可致命貧 血。

牛蜱熱的傳播

牛蜱是一種八腳昆蟲，外形跟甲蟲相似，但它們其實是一種節肢動物（與蜘蛛屬同一綱），通常生長在有草 叢的地區，並靠吸食狗和牛等動物的血為生。當牛蜱咬到狗隻，並附在狗隻身上吸血時，會把牛蜱熱這種微 生物注入狗隻的體內。在香港的牛蜱一般帶有 Ehrlichia, Anaplasma, Babesia, and Borrelia 等致病原。牛 蜱在吸血前的外形又小又扁，但吸血後會漲大起來像一大顆提子乾一樣。

感染心牛蜱熱的病症

➢ 失去食慾

➢ 精神萎靡 (通常狗隻會不願意去進行散步等活動，亦沒有平常那麼愛玩，並可能不願意走上樓梯)

➢ 小便呈深紅色 (紅血球會被牛蜱熱破壞並從尿液中排出，令狗隻的尿液呈現非常深的鐵銹色或紅色)

➢ 淋巴結腫脹

➢ 發燒

➢ 出現瘀斑

牛蜱熱的預防及治療

◆ 治療

治療牛蜱熱，除了抗生素外，可能需要支援治療如靜脈注射、輸血等以緩和貧血。 藥物治療過後，如果沒有預防牛蜱的措施，動物很容易再被感染

◆ 預防
- 口服預防藥: Bravecto (每 3 個月 1 次)
- 滴頸: Frontline, Advantix (每個月 1 次)
- 頸帶: Preventic (建議每 3 個月換 1 次), Seresto (建議每 8 個月換 1 次)

如果居住地方容易有跳蚤和牛蜱，頸帶可配以口服預防藥或滴頸同時使用,以達到最高預防效用。

香港動物領養中心
Hong Kong Animal Adoption Centre

(參考附件) GHP + CBC



Test	Results	Reference Interval	LOW / NORMAL / HIGH
ProCyte Dx (June 10, 2021 12:14 PM)			
RBC	1.54 x10^12/L	5.65 - 8.87	LOW
HCT	12.4 %	37.3 - 61.7	LOW
HGB	3.8 g/dL	13.1 - 20.5	LOW
MCV	80.5 fL	61.6 - 73.5	HIGH
MCH	24.7 pg	21.2 - 25.9	
MCHC	30.6 g/dL	32.0 - 37.9	LOW
RDW	16.6 %	13.6 - 21.7	
%RETIC	5.7 %		
RETIC	87.6 K/µL	10.0 - 110.0	
RETIC-HGB	23.2 pg	22.3 - 29.6	
WBC	7.21 x10^9/L	5.05 - 16.76	
%NEU	55.4 %		
%LYM	29.8 %		
%MONO	13.5 %		
%EOS	1.2 %		
%BASO	0.1 %		
NEU	3.99 x10^9/L	2.95 - 11.64	
LYM	2.15 x10^9/L	1.05 - 5.10	
MONO	0.97 x10^9/L	0.16 - 1.12	
EOS	0.09 x10^9/L	0.06 - 1.23	
BASO	0.01 x10^9/L	0.00 - 0.10	
PLT	* 5 K/µL	148 - 484	LOW
MPV	18.6 fL	8.7 - 13.2	HIGH
PDW	--.- fL	9.1 - 19.4	
PCT	0.01 %	0.14 - 0.46	LOW



Test	Results	Reference Interval	LOW / NORMAL / HIGH
Catalyst One (June 10, 2021 12:20 PM)			
GLU	4.86 mmol/L	3.89 - 7.95	
CREA	79 µmol/L	44 - 159	
UREA	9.0 mmol/L	2.5 - 9.6	
BUN/CREA	28		
PHOS	1.17 mmol/L	0.81 - 2.20	
CA	2.18 mmol/L	1.98 - 3.00	
TP	58 g/L	52 - 82	
ALB	25 g/L	22 - 39	
GLOB	33 g/L	25 - 45	
ALB/GLOB	0.7		
ALT	39 U/L	10 - 125	
ALKP	116 U/L	23 - 212	
GGT	0 U/L	0 - 11	
TBIL	17 µmol/L	0 - 15	HIGH
CHOL	1.63 mmol/L	2.84 - 8.26	LOW
AMYL	1039 U/L	500 - 1500	
LIPA	173 U/L	200 - 1800	LOW
Na	151 mmol/L	144 - 160	
K	5.1 mmol/L	3.5 - 5.8	
Na/K	30		
Cl	115 mmol/L	109 - 122	
Osm Calc	305 mmol/kg		

香港動物領養中心
Hong Kong Animal Adoption Centre

(參考附件) 4dx 心絲蟲及牛蜱熱病毒檢驗



SNAPshot Dx

AP_spp	Negative
EC-EE	Negative
HW	Negative
Lyme	Negative